ZEOLITE - CLINOPTILOLITE

Additif technologique anti-mottant pour la fabrication d'aliment du bétail.
La zéolite est une matière première activée par traitement thermique composée principalement d'une Clinoptilolite d'origine sédimentaire.
La zéolite est utilisée pour tout type d'animaux : volaille, porcs, bovins, poissons

1. INTERETS NUTRITIONNELS :

La ZEOLITE présente une affinité spécifique pour les molécules d'ammoniac et d'eau.
La ZEOLITE a une structure à 3 dimensions formant un réseau de cavités et de pores de 0,4 nm.
Elle n'adsorbe donc pas les molécules nutritionnellement intéressantes.

2. CONSTITUANTS :

	Valeur seuil	Résultats 2011
Clinoptilolite	Min 80 %	86 à 94 %
Dioxine	Max 0.75	0.2
Plomb (mg/kg)	Max 30	10.96 (7.45-13.59)
Cadmium (mg/kg)	Max 2	0.0219 (0.0074-0.0365)
Arsenic (mg/kg)	Max 2	1.01
Mercure (mg/kg)	Max 0.1	0.0049-0.00606
SiO2 (%)	Min 62%	70.37 (69.3-71.2)
AL2O3 (%)	Max 14%	11.98 (11.51-12.62)
Fe2O3 (%)	Max 2.3%	1.76 (1.59-2.07)
CaO (%)	Max 5.5%	3.57 (3.51-3.86)
Humidité	Max 10 %	4.74 (3.22-6.72)

3. MODE D'EMPLOI :

Mélanger la zéolite à la ration selon les doses recommandées ci-dessous :

- Porcs charcutiers : 5 à 10 kg/Tonne d'aliment
- Poulet, dindes de chair : 7 kg/Tonne d'aliment
- Bovins : 100 g/ jour

4. CONDITIONNEMENT :

Sac de 25 kg - Big Bag d'1 Tonne

4. PRECAUTIONS :

Conserver dans un endroit frais sec et bien ventilé

Mise à jour 02/2013